

VISCOFOL

EKSTRAKT KWASÓW HUMUSOWYCH
NA BAZIE LEONARDYTÓW 100%

BLACK

G C i C

ZAWARTOŚĆ

EKSTRAKT KWASÓW HUMUSOWYCH
NA BAZIE LEONARDYTÓW 100%.

KWASY HUMUSOWE – FORMULACJA SC.

STOSOWANIE – DOLISTNE I DOGLEBOWE.

Razem kwasy humusowe	25% (w/w)
----------------------	------------------

Kwasy humusowe	20,5% (w/w)
----------------	--------------------

Kwasy fulwowe	4,5% (w/w)
---------------	-------------------

100% pH = 4,2

CHARAKTERYSTYKA

VISCOFOL Black jest formacją SC kwasów humusowych pozyskanych naturalnie (niechemicznie) z wysokiej jakości złóż amerykańskich leonardytów. Zawiera kwas huminowy, kwas fulwowy, kwas ulmowy, naturalne huminy oraz naturalne składniki odżywcze i pierwiastki śladowe pochodzące z leonardytów. Ma niskie pH, co jest ważne dla jego przyswajalności.

Ze względu na kwaśny odczyn VISCOFOL Black:

- Bardzo ułatwia mieszanie z większością pestycydów i nawozów.
- Pomaga szybciej i łatwiej wchłonąć wiele ważnych mikroelementów (Fe, Mn, itd.) poprzez system korzeniowy.
- Stymuluje rozwój korzeni i całej rośliny.

VISCOFOL Black stosowany doglebowo pomaga poprawić strukturę gleby, zwiększa napowietrzenie, zmniejsza zasolenie, odblokowuje wchłanianie substancji odżywczych, sprzyja aktywności bakterii i zwiększa zdolność wymiany kationów

makro i mikrośladników. Stosowany dolistnie działa pobudzająco na rośliny uprawne. Dzięki niskiemu pH pomaga wnikać pestycydom poprzez woskową warstwę liścia.

VISCOFOL Black obniża pH roztworu (pestycydów i/lub nawozów dolistnych), gdy woda ma pH zasadowe. Niższe pH roztworu zwiększa skuteczność większości pestycydów i sprzyja szybszemu wchłanianiu.

Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiska, przestrzegaj instrukcji użycia.

**Równomierne rozprowadzenie.
Maksymalny pobór składników.**

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Podczas używania nie jeść, nie pić, nie palić.

5Le

Opakowanie
zbiorcze
4 x 5L

DAWKOWANIE I INSTRUKCJA UŻYCIA

VISCOFOL Black jest zalecany dla większości upraw doglebowo i nalistnie. W celu zwiększenia skuteczności produktu zaleca się stosowanie go w sposób ciągły podczas całego cyklu wegetacyjnego. Przed użyciem wstrząśnij.

MIESZANIE

Ze względu na jego pH i skład VISCOFOL Black może być mieszany z większością nawozów i pestycydów. Przed użyciem zaleca się przeprowadzić test mieszania. Nie mieszać z herbicydami sulfonylomocznikowymi, olejami mineralnymi, azotanami wapnia lub produktami reakcji kwasowej z herbicydami, które nie są zgodne z substancją organiczną.

PRZECHOWYWANIE

Produkt zachowuje swoje właściwości w normalnych warunkach wilgotności, temperatury i ciśnienia. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym pojemniku przez maksymalnie 2 lata.

Nie przechowywać w temperaturze poniżej 0°C lub powyżej 40°C.

POSTĘPOWANIE Z PUSTYM OPAKOWANIEM

Oplukać pojemnik 3 razy, popluczyny wąż do zbiornika opryskiwacza. Pusty pojemnik zwrócić do sprzedawcy.

UPRAWA		DAWKA	TERMIN STOSOWANIA
Zboża	zaprawianie	1 l/1 tonę ziarna siewnego	Viscofol Black można stosować w zabiegu oddzielnym lub łącznie z zaprawą nasienną zgodnie z technologią polecaną przez producenta zaprawy. Przy stosowaniu oddzielnym użyc 10 l wody/t ziarna
Zboża – zabiegi nalistne	ozime	1-2 l/ha	Jesienią w fazie 2-4 liści Wiosną bezpośrednio po ruszeniu wegetacji i ew. kolejny po 2-3 tyg.
	jare		W fazie 2-4 liści
Rzepak	ozimy	1-2 l/ha	Pierwszy zabieg wykonać jesienią poczynając od fazy 5 liści. Zabieg powtórzyć wiosną w fazie wydłużania pędu głównego.
	jary		Pierwszy zabieg wykonać poczynając od fazy 5 liści. Zabieg powtórzyć w fazie wydłużania pędu głównego.
Kukurydza		1-2 l/ha	Pierwszy zabieg wykonać gdy rośliny osiągną 20-25 cm. Oprysk powtórzyć po 2-3 tygodniach
Buraki cukrowe, buraki pastewne		1,5 - 2 l/ha	Pierwszy oprysk wykonać gdy rośliny osiągną wysokość 20-25 cm. Drugi zabieg po upływie 15-20 dni.
Warzywa - przygotowanie rozsady		250 ml/100 l wody	Rozsadę moczyć lub podlewać przed wysadzeniem (podana dawka przewidziana na rozsadę na 1 ha powierzchni.)
Warzywa (pomidory, fasola, cukinie, ogórki)		0,5-1 l/ha	Po 14 dniach od wysadzenia rozsady w pole wykonać oprysk dolistny Viscofol Black 0,5-1 l/ha. Po 14 dniach powtórzyć. Za pomocą systemu trygacyjnego Viscofol Black 250 ml na 100 l wody
Ziemniaki – zaprawianie sadzeniaków		250 ml/100 l wody	Sadzeniaki moczyć 24 h przed wysadzeniem w 250 ml/100 l wody
Ziemniaki, cebula, marchew i in.		1-2 l/ha	Pierwsze zastosowanie, gdy rośliny osiągną wysokość 10-20 cm. Zabieg powtórzyć po upływie 15-20 dni.
Sady - zakładanie	250 ml/100 l – moczenie przed sadzeniem	25 ml/10 l – podlewanie po wysadzeniu	Korzenie drzewek moczyć przed posadzeniem.
	25 ml/10 l – podlewanie po wysadzeniu		Następnie podlewać drzewka 25-50 ml/10 l wody/drzewo.
Jagodniki, truskawki	1,5-2 l/ha – opryski w trakcie wegetacji	250 ml/100 l – moczenie przed sadzeniem	W trakcie wegetacji opryskiwać drzewa dawką 25 ml/10 l wody/ drzewo łącznie z innymi nawozami nalistnymi
	250 ml/100 l – moczenie przed sadzeniem		Sadzonki moczyć w roztworze przed posadzeniem.
	25 ml/10 l – podlewanie po wysadzeniu	1,5-2 l/ha – opryski w trakcie wegetacji	14 dni po posadzeniu rośliny podlać 25 ml/10 l wody/roślinę
	1,5-2 l/ha – opryski w trakcie wegetacji		Następnie wykonać opryski dawką 1,5 -2 l/ha Viscofol Black

ZASTRZEŻENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszystkie dostarczane przez nas produkty oznaczają się wysoką jakością i jesteśmy przekonani o ich przydatności. Jednak nie mamy możliwości kontroli nad warunkami ich przechowywania, transportu, mieszania lub używania, ani też warunkami pogodowymi przed, po lub w trakcie wykonywania oprysku, które mogą wpływać na działanie produktu. Z tego względu, wszystkie warunki i gwarancje ustawowe lub wszelkie inne dotyczące jakości lub przydatności do jakiegokolwiek celu są wyłączone i zarówno my jak i pośrednicy sprzedaży, nie ponosimy odpowiedzialności za wadliwe działanie, szkody lub obrażenia powstałe wskutek przechowywania produktu, sposobu obchodzenia się z nim lub używania.



Global Crop Improvement Company Ltd.

20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, UK

office@gcic-global.com

Tel: +44 01480 810137